

Fecha:

Médico:



Guía para su cita

La artritis idiopática juvenil poliarticular moderada a grave se asocia con algunos síntomas frecuentes, pero estos afectan a cada niño de manera diferente. Por eso, el médico necesita saber exactamente cuál es el efecto de esta enfermedad en el caso de su hijo/a. Lleve esta ficha a la siguiente consulta con el médico para guiar la conversación.

Pregúntele a su hijo/a lo siguiente:

¿Cuál fue la intensidad del dolor en las articulaciones la semana pasada?

(1 = sin dolor, 10 = dolor intenso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cómo te afectan los síntomas? (Marque todas las opciones que correspondan).

- El dolor y la rigidez me afectan cuando estoy **haciendo las cosas que me gustan**.
- He tenido que **cambiar mis hábitos diarios** porque los síntomas complican demasiado algunas tareas (por ejemplo, caminar hacia o desde la escuela).
- El dolor en las articulaciones **me afecta durante mis actividades sociales** (por ejemplo, al practicar deportes).
- A veces las articulaciones **me duelen demasiado como para hacer ciertas cosas con amigos y familiares**.

(Continúa en la página siguiente).

INDICACIÓN: ENBREL se indica para aliviar los signos y síntomas de la artritis idiopática juvenil poliarticular activa moderada a grave en niños de 2 años o más.

Consulte la información importante de seguridad en la página 4.



¿Tienes alguno de estos síntomas? (Marque todas las opciones que correspondan).

- Dolor o rigidez en las articulaciones** al moverlas.
- Rigidez por las mañanas** o después de descansar.
- Calor o dolor a la palpación en las articulaciones.**
- Amplitud de movimiento limitada** (tu capacidad para mover las articulaciones).
- Hinchazón en las articulaciones.**
- Cansancio permanente.**

¿Tus síntomas han dificultado alguna de estas actividades?

Vestirse (lo cual incluye atarse los cordones y abotonarse la ropa)	Sí	No	No sabe
Hacer tareas de la casa o jugar	Sí	No	No sabe
Llevarse una taza a la boca	Sí	No	No sabe
Meterse en la cama y salir de ella	Sí	No	No sabe
Subir una escalera	Sí	No	No sabe

Preguntas para analizar con el médico de su hijo/a:

- 1.** ¿El tratamiento actual de mi hijo/a alivia su dolor en las articulaciones?
- 2.** ¿Un medicamento biológico como ENBREL podría ser una opción adecuada para mi hijo/a?
- 3.** ¿Qué efecto podría hacer ENBREL en los síntomas de mi hijo/a?

(Continúa en la página siguiente).

Consulte la información importante de seguridad en la página 4.



4. ¿Cuándo podría mi hijo/a empezar a notar resultados con ENBREL?
5. ¿Cómo puede contribuir ENBREL a aliviar los síntomas en las articulaciones de mi hijo/a con el tiempo?
6. ¿Desde hace cuánto se aprobó ENBREL para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil poliarticular moderada a grave?
7. ¿En qué se diferencia ENBREL del metotrexato?
8. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENBREL?

Agregue otras preguntas:



Enbrel® (etanercept) es un medicamento de venta con receta que se recibe (administra) mediante una inyección.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre ENBREL?

ENBREL es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis e infecciones causadas por virus, hongos o bacterias que se diseminaron por todo el organismo. Algunos pacientes murieron por esas infecciones. Su profesional médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que usted reciba ENBREL y también hacerle un seguimiento continuo de su salud antes, durante y después del tratamiento con ENBREL, incluso si dio negativo en la prueba de tuberculosis.

Ha habido algunos casos de tipos de cáncer poco habituales en niños y pacientes adolescentes que empezaron a usar inhibidores del factor de necrosis tumoral (FNT) antes de los 18 años de edad. Algunos de esos casos derivaron en la muerte de los pacientes. Además, en los niños, adolescentes y adultos que utilizan inhibidores del FNT, como ENBREL, pueden aumentar las probabilidades de presentar linfoma u otros tipos de cáncer. Los pacientes con artritis reumatoide pueden tener más probabilidades de presentar linfoma.

Antes de empezar el tratamiento con ENBREL, hable con su profesional médico en cualquiera de los siguientes casos:

- Si tiene alguna afección preexistente.
- Si toma algún medicamento, incluidos los tratamientos a base de hierbas.
- Si cree que tiene una infección, si está recibiendo tratamiento para una, si presenta signos de una o si tiene propensión a infecciones. No debe empezar el tratamiento con ENBREL si tiene cualquier tipo de infección, salvo que su profesional médico le diga que no hay problema.
- Si tiene cortes o llagas abiertas.
- Si tiene diabetes, VIH o el sistema inmunitario debilitado.
- Si tiene tuberculosis o ha estado en contacto estrecho con alguien que tuvo esa enfermedad.
- Si nació en un país donde el riesgo de contagio de tuberculosis es mayor, si ha vivido en alguno de esos países o ha viajado a ellos. Consulte a su profesional médico si no lo sabe con certeza.
- Si vive o ha vivido en ciertas partes del país (como los valles de los ríos Ohio y Misisipi o el sudoeste) donde hay más riesgo de contraer ciertos tipos de micosis, como la histoplasmosis, o si ha viajado a esos lugares. Si utiliza ENBREL, esas infecciones pueden presentarse o agravarse. Si no sabe con certeza si esas infecciones son frecuentes en las zonas que visitó, consulte a su profesional médico.
- Si tiene o ha tenido hepatitis B.
- Si tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca.

- Si presenta síntomas tales como fiebre continua, moretones, hemorragias o palidez durante su tratamiento con ENBREL.
- Si utiliza los medicamentos Kineret (anakinra), Orencia (abatacept) o Cytosan (ciclofosfamida).
- Si toma antidiabéticos.
- Si tiene, ha tenido o presenta un trastorno nervioso grave, convulsiones, entumecimiento u hormigueo, o una enfermedad que afecte el sistema nervioso, como esclerosis múltiple o síndrome de Guillain-Barré.
- Si tiene una cirugía programada.
- Si ha recibido alguna vacuna hace poco o tiene alguna vacunación programada. Antes de iniciar el tratamiento con ENBREL, todas las vacunas deben estar al día. Los pacientes que utilicen ENBREL no deben recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.
- Si tiene alergia al caucho o al látex.
- Si está embarazada, está buscando un embarazo o está amamantando.
- Si ha estado cerca de alguien que tenía varicela.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENBREL?

ENBREL puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo: aparición o empeoramiento de **infecciones**; la **hepatitis B** puede activarse si ya la tuvo; **problemas en el sistema nervioso**, como esclerosis múltiple, convulsiones o inflamación de los nervios oculares; **problemas en la sangre** (algunos mortales); aparición o empeoramiento de una **insuficiencia cardíaca**; aparición o empeoramiento de una **psoriasis**; **reacciones alérgicas**; **reacciones autoinmunitarias**, como un síndrome similar al lupus y hepatitis autoinmunitaria.

Algunos de los efectos secundarios habituales son los siguientes:

reacciones en el lugar de la inyección e infecciones de las vías respiratorias superiores (infecciones de los senos paranasales).

Por lo general, los efectos secundarios en niños tuvieron una frecuencia similar y fueron de tipos parecidos a los observados en pacientes adultos. A grandes rasgos, los tipos de infecciones informados fueron leves y similares a los que se suelen ver en niños.

Estos no son todos los efectos secundarios de ENBREL. Hable con su profesional médico si presenta algún efecto secundario que le produce molestias o no desaparece.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, hágasela a su profesional médico. Le recomendamos que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la [ficha técnica](#) y la [guía de administración](#) en este sitio web.



Fabricado por Immunex Corporation
Thousand Oaks, CA 91320

Comercializado por Amgen Inc.

Enbrel.com

©2021 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA 91320. Todos los derechos reservados.
(USA-916-82700)